



## Nedgang i vildtudbyttet

**Det samlede vildtudbytte i 1997/98 faldt 2 pct.**

Det samlede vildtudbytte i sæsonen 1997/98 faldt med ca. 40.000 stk. til 2.564.000 stk. vildt i forhold til forrige sæson. Udbyttet i 1997/98 var 283.300 stk. nedlagte pattedyr og 2.280.600 stk. nedlagte fugle.

Vildtudbyttet af nedlagte pattedyr og fugle er blevet registreret siden 1941/42. Den officielle danske vildtstatistik bygger på jægerens oplysninger i forbindelse med fornyelsen af jagttegn. Det danske jagtterræn omfatter skønsmæssigt 60.000 km<sup>2</sup>, hvilket giver et vildtudbytte på gennemsnitligt 43 stk. vildt pr. km<sup>2</sup> jagtterræn i den seneste jagtsæson. I den foregående tiårsperiode blev der i gennemsnit nedlagt 50 stk. vildt pr. km<sup>2</sup> jagtterræn. Der var i sæsonen 1997/98 171.000 jagttegnsløsere, hvilket er det samme som for sæsonen 1996/97.

**Mindre fald i udbyttet af rådyr og andet hjortevildt**

Af tabel 1. fremgår det, at jagtudbyttet af rådyr er faldet med 9.000 stk. vildt eller med 8 pct. fra 1996/97 til 1997/98, men udbyttet ligger stadig over 100.000 stk. For udbyttet i 1997/98 af krondyr og dådyr ses ligeledes et mindre fald.

**Tabel 1.**

**Udbyttet af nedlagte pattedyr 1941/42 - 1997/98**

	1941/42- 1945/46	1951/52- 1955/56	1961/62- 1965/66	1971/72- 1975/76	1981/82- 1985/86	1991/92- 1995/96	1996/97	1997/98
	1 000 stk.							
<b>I alt</b>	<b>478,0</b>	<b>510,9</b>	<b>501,1</b>	<b>413,9</b>	<b>316,8</b>	<b>320,2</b>	<b>315,4</b>	<b>283,3</b>
Krondyr	0,4	0,8	0,6	0,8	1,7	2,4	3,5	3,3
Dådyr	1,4	1,6	1,9	1,7	1,8	3,8	4,3	4,1
Sikahjorte	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,7	0,7
Rådyr	17,0	23,0	30,0	33,0	50,2	94,2	110,0	101,0
Harer	422,0	402,0	375,0	292,0	197,8	163,8	136,0	113,0
Kaniner	...	8,8	12,0	10,0	6,3	9,5	5,2	4,6
Egern	...	16,0	14,0	14,0	2,7	0,1	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>
Ræve	23,0	40,0	56,0	52,0	45,4	37,2	44,0	42,0
Grævlinger	3,5	3,1	2,6	1,6	1,5	0,6	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>
Ildere	7,9	7,3	3,0	2,5	1,6	0,8	1,4	1,8
Lækatte	...	6,2	3,0	2,6	0,4	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>
Mink	...	...	...	0,8	1,4	3,8	6,0	8,0
Husmår	1,7	1,0	2,1	2,4	5,8	3,6	4,3	4,8
Oddere	0,3	0,2	0,2	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>
Spættet sæl	0,6	0,6	0,4	0,3	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>

Anm. Gennemsnit for femårsperioderne. Opgørelsesperiode 1. april til 31. marts.

<sup>1</sup> Angiver, at tal ikke foreligger. Arterne er totalfredede, men enkelte nedlagte dyr kan forekomme i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader.

Kilde: Materiale fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.

## Harer sætter ny bundrekord

Udbyttet af harer er igen faldet markant med 23.000 stk. til 113.000 stk. vildt fra 1996/97 til 1997/98. Det fremgår af tabel 1., at antallet af nedlagte harer er på et væsentligt lavere niveau end den tidligere femårsperiodes gennemsnit, og at der ses et fortsat fald i jagtudbyttet siden vildtstatistikens start.

Tabel 2.

### Udbyttet af nedlagte fugle 1941/42 - 1997/98

	1941/42- 1945/46	1951/52- 1955/56	1961/62- 1965/66	1971/72- 1975/76	1981/82- 1985/86	1991/92- 1995/96	1996/97	1997/98
	1 000 stk.							
<b>I alt</b>	<b>1 825,8</b>	<b>2 231,3</b>	<b>2 531,5</b>	<b>2 824,2</b>	<b>2 575,7</b>	<b>2 624,9</b>	<b>2 288,9</b>	<b>2 280,6</b>
Agerhøns	324,0	319,0	233,0	203,0	57,0	96,8	73,0	65,0
Fasaner	321,0	374,0	562,0	730,0	675,8	824,6	728,0	705,0
Fiskehejre	3,8	4,9	4,6	5,7	1,1	1,4	1,9	2,2
Skovsnepper	23,0	21,0	18,0	18,0	18,0	28,4	28,0	22,0
Bekkasiner	60,0	49,0	61,0	74,0	42,4	25,0	22,0	20,0
Gråænder	347,0	502,0	370,0	366,0	599,2	705,0	634,0	643,0
Andre svømmeænder	...	...	145,0	142,0	139,0	141,2	89,0	94,0
Edderfugle	129,0	79,0	115,0	153,0	151,0	118,4	84,0	106,0
Andre dykænder	...	117,0	104,0	107,0	75,2	51,2	39,0	36,0
Gæs	12,0	8,4	8,9	8,5	11,8	15,8	16,0	15,0
Blishøns	...	...	...	85,0	59,0	22,2	14,0	13,0
Regnsøver	32,0	46,0	44,0	34,0	12,2	4,2	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>
Måger	158,9	98,5	134,2	220,0	147,8	63,8 <sup>2</sup>	45,0	41,0
Ringduer	137,0	285,0	398,0	325,0	242,0	308,4	276,0	288,0
Tyrkerduer	...	...	...	...	9,9	10,7	9,9	10,7
Råger	78,0	78,0	81,0	110,0	81,8	84,2	99,0	84,0
Krager	222,0	187,0	199,0	290,0	155,0	71,8	78,0	81,0
Husskader	137,0	161,0	188,0	173,0	75,0	42,8	43,0	43,0
Skovskader	...	...	...	...	13,5	4,1	.. <sup>1</sup>	.. <sup>1</sup>
Skarver	...	...	...	...	...	1,4	3,7	4,3
Stære	...	...	...	...	...	1,4	5,4	7,4

Anm. Gennemsnit for femårsperioderne. Opgørelsesperiode 1. april til 31. marts.

<sup>1</sup> Angiver, at tal ikke foreligger. Arterne er totalfredede, men enkelte nedlagte dyr kan forekomme i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader.

<sup>2</sup> Fra jagtsæsonen 1994/95 er hættemåger og stormmåger blevet totalfredet.

Kilde: Materiale fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.

## Udbyttet af fuglevildt næsten uændret

Tabel 2. viser, at fra 1996/97 til 1997/98 er jagtudbyttet af fuglevildt faldet med 8.300 stk. til 2.280.600 stk. vildt. Dette lille fald dækker over både fremgange og tilbagegange i udbyttet af de enkelte arter. Udbyttet af edderfugle gik stærkest frem sammen med gråænder og andre svømmeænder. Det skyldes en særdeles god yngleperiode og fine vejrforhold for havjagt. Udbyttet af fasaner, agerhøns, skovsnepper, råger og måger fortsætter faldet fra tidligere sæsoner. Fasaner og gråænder er de to fuglearter med det største vildtudbytte, nemlig ca. 60 pct. af samtlige nedlagte fugle. Både gråænder og fasaner bliver i stort omfang opdrættet og udsat med jagt for øje. Udbyttetallene er derfor uanvendelige som målestok for de vilde bestandes trivsel.

## Sådan får De mere information

Mere detaljerede oplysninger om metoder i *Vildtstatistikken* kan findes i serien *Miljø og energi* (Statistiske Efterretninger).

## Næste offentliggørelse

Vildtudbyttet 1998/99 forventes offentliggjort foråret 2000.

## Henvendelse

Vibeke Ravn Sørensen, tlf. 39 17 33 16, vkr@dst.dk